


Infectiologie parasitologie

ANTIBIOTIQUES-PENICILLINES
ANTIBIOTIQUES-MACROLIDES
ANTIBIOTIQUES-SULFAMIDES
ANTIBIOTIQUES-NITROFURANES
ANTIBIOTIQUES-ANTIPARASITAIRES
ANTIPARASITAIRES

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



EXTENCILLINE®
Solution injectable en IM

PROTOCOLE

■ INDICATION(S)

- Prévention des rechutes de rhumatisme articulaire aigu (RAA).
- Angine streptococcique si le traitement par voie orale est impossible.
- Pyodermite à répétition.

■ POSOLOGIE

A injecter par voie intramusculaire profonde uniquement
1 UI = 0,6 µg

Prévention de rechute du RAA (Cf. protocole RAA) :

Enfant de moins de 25 kg : 1 injection IM de 0,6 MUI toutes les 3 semaines.

Enfant de plus de 25 kg : 1 injection IM de 1,2 MUI toutes les 3 semaines.

Adulte : 1 injection IM de 2,4 MUI toutes les 3 semaines.

Angine : 1 seule injection

Enfant de moins de 25kg : 1 injection IM unique de 0,6MUI.

Enfant de plus de 25 kg : 1 injection IM unique de 1,2 MUI.

Adulte : 1 injection IM unique de 2,4 MUI.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Préparer aseptiquement la solution en introduisant dans le flacon :

- 2 ml d'eau pour préparation injectable (EPPI) pour une dose de 0,6 MUI ;
- 4 ml d'EPPI pour une dose de 1,2 MUI ;

- 8 ml d'EPPI pour une dose de 2,4 MUI. Agiter soigneusement avant l'emploi. Pour atténuer la douleur de l'injection on peut mélanger à la solution 0,5ml ou 1ml de lidocaïne à 1% (Cf. protocole RAA).

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux pénicillines et céphalosporines.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT



Possible

■ EFFETS INDÉSIRABLES

- Allergies : éruption cutanée, urticaire, gêne respiratoire, choc.
- En cas d'allergie, arrêter le traitement.

CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C
(flacon non ouvert)

SOLUTION MISE EN SUSPENSION



Pas plus de 24 H
au réfrigérateur

AMOXICILLINE
125 mg / 5 ml
250 mg / 5 ml
500 mg / 5 ml

INFECTIOLOGIE ANTIBIOTIQUES-PENICILLINES

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



CLAMOXYL®
Flacon de 60 ml+ cuillère mesure 5 ml

AMOXICILLINE®
BRISTAMOX®

PROTOCOLE

INDICATION(S)

- Infections ORL (otite, angine, pneumonie), érysipèle, surinfection bronchiques.
- Certaines infections génitales et urinaires.

POSOLOGIE

50 à 100 mg/kg/jour en 2 ou mieux en 3 prises espacées de 8 heures pendant **10 jours au cours des repas.**

1 flacon contient 12 cuillères mesures.

Remplir le flacon avec de l'eau bouillie refroidie ou de l'eau en bouteille jusqu'au trait gravé dans le verre, conserver au frais.

Bien agiter avant chaque prise.

CLAMOXYL 125 mg/5 ml

- Nourrisson de moins de 4 Kg : une demi cuillère mesure le matin le midi et le soir.
- Nourrisson de 4 Kg à 7 Kg : une cuillère mesure le matin, le midi et le soir.

CLAMOXYL 250 mg/5 ml

- Enfant de 8 Kg à 10 Kg : 1 cuillère mesure le matin, le midi et le soir.

CLAMOXYL 500mg/5ml

- Enfant de 10 Kg à 13 Kg : 1 cuillère mesure le matin et le soir.

Cas particuliers :

Angines : dans l'**angine aiguë streptococcique** chez l'enfant de plus de 30 mois, un traitement **de 6 jours** assure l'éradication du streptocoque.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dans les infections sévères des doses plus importantes sont nécessaires.
En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS


- Allergie aux pénicillines et céphalosporines.
- Phénylcétonurie.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Allergies : éruption cutanée, urticaire, gêne respiratoire, choc.
- **En cas d'allergie, arrêter le traitement.**


CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C
(flacon non ouvert)

SOLUTION MISE EN SUSPENSION



Pas plus de 7 jours
au réfrigérateur

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



CLAMOXYL 500®
Gélule

AMOXICILLINE®
AGRAM®
BRISTAMOX®

PROTOCOLE

■ INDICATION(S)

- Infections ORL (otite, angine, pneumonie), érysipèle, bronchites aiguës et exacerbation de bronchites chroniques, pneumonie.
- Certaines infections génitales et urinaires.

■ POSOLOGIE

- La gélule est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
- La posologie usuelle pour l'adulte est de 2 g/jour ou 3 g/jour en 2 à 3 prises pendant **10 à 14 jours au cours des repas**.
- Abscès dento-osseux aigu avec complication cellulaire, en présence de signes généraux : 1 gélule matin midi et soir pendant 3 jours après l'acte dentaire.

Cas particuliers :

Dans l'**angine aiguë streptococcique**, un traitement de **6 jours** à la posologie de 2 g/jour en 2 prises assure l'éradication du streptocoque (2 gélules le matin et 2 gélules le soir).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dans les infections sévères des doses plus importantes sont nécessaires.
En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux pénicillines et céphalosporines.
- Enfant de moins de 6 ans.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT




Possible

■ EFFETS INDÉSIRABLES

- Allergies : éruption cutanée, urticaire, gêne respiratoire, choc.
- En cas d'allergie, arrêter le traitement.

CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



**AMOXICILLINE
ACIDE CLAVULANIQUE®**

Flacon de 30 ml ou 60 ml
+ seringue doseuse

**AUGMENTIN®
AMOXICLAV**

AVIS MEDICAL

■ INDICATION(S)

Infections ORL récidivantes en l'absence d'efficacité des antibiotiques usuels comme l'amoxicilline.

■ POSOLOGIE

80 mg/kg/jour en 3 prises, sans dépasser la posologie de 3 g d'amoxicilline par jour **au début des repas pendant 8 à 10 jours.**

Un flacon contient 112 doses-gradation dans un flacon de 30 ml. 1 dose = 1 Kg.

Le poids indiqué sur la seringue correspond à la dose pour une prise. 3 prises par jour sont nécessaires.

1 dose-gradation/kg matin, midi et soir en début de repas.

Remplir le flacon avec de l'eau bouillie refroidie ou de l'eau en bouteille jusqu'au trait gravé dans le verre, conserver au frais.

Bien agiter avant chaque prise.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux pénicillines et céphalosporines.
- Antécédents d'atteintes hépatiques liées à la prise d'amoxicilline-acide clavulanique.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT



Possible

■ EFFETS INDÉSIRABLES


- Nausées, vomissements, diarrhées.
- Allergies : éruption cutanée, urticaire, gêne respiratoire, choc... En cas d'allergie, arrêter le traitement.
- Hépatites.
- Les effets indésirables sont plus importants et fréquents qu'avec l'amoxicilline seul.

CONSERVATION

HUMIDITÉ



TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C
(flacon non ouvert)

SOLUTION MISE EN SUSPENSION



Pas plus de 7 jours
au réfrigérateur

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



**AMOXICILLINE
ACIDE CLAVULANIQUE®**
Comprimé pelliculé

**AUGMENTIN®
AMOXICLAV**

AVIS MEDICAL

■ INDICATION(S)

Infections ORL et urinaires récidivantes en l'absence d'efficacité des antibiotiques usuels comme l'amoxicilline.

■ POSOLOGIE

1 dose=2 comprimés.

Selon l'indication prendre en début de repas pendant 8 à 10 jours :

2 comprimés matin et soir (Angine récidivante)

ou

2 comprimés matin, midi et soir (OMA, cystite récidivante, pneumonie).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Réévaluer le traitement au bout de 3 jours. Si pas d'amélioration consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux pénicillines et céphalosporines.
- Antécédents d'atteintes hépatiques liées à la prise d'amoxicilline-acide clavulanique.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT



Possible

■ EFFETS INDÉSIRABLES


- Nausées, vomissements, diarrhées.
- Allergies : éruption cutanée, urticaire, gêne respiratoire, choc...
- En cas d'allergie, arrêter le traitement.
- Hépatites.
- Les effets indésirables sont plus importants et fréquents qu'avec l'amoxicilline seul.

CONSERVATION

HUMIDITÉ



TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C
(flacon non ouvert)

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



ROVAMYCINE®
Comprimé pelliculé

AVIS MEDICAL

■ INDICATION(S)

- Angine bactérienne en alternative aux pénicillines (EXTENCILLINE®, OSPEN®, CLAMOXYL®...).
- Pneumonie à germes atypiques.
- Infection cutanée généralisée (impétigo, érysipèle...).
- Infection génitale à Chlamydiae trachomatis.
- Infection de la bouche.
- **Toxoplasmose de la femme enceinte.**

■ POSOLOGIE

A prendre au milieu des repas.

Enfant (comprimé à 1,5MUI) :

1,5 à 3 M UI par 10 kg de poids et par jour, en 2 à 3 prises.

- 10 Kg à 20 Kg : 1 comprimé de 1,5 MUI le matin et le soir.
- plus de 20 Kg : 2 comprimés de 1,5 MUI le matin et le soir.

Adulte (comprimé à 3MUI):

soit 2 à 3 comprimés à 3 M UI ou 4 à 6 comprimés à 1,5 M UI par jour, en 2 ou 3 prises.

La durée de traitement sera de 7 à 14 jours.

Cas particuliers :

La durée du traitement des angines est de 10 jours.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à la spiramycine.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT




Impossible

■ EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.

CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



JOSACINE®

Granulé pour suspension buvable 60 ml
+ seringue orale graduée en poids

AVIS MEDICAL

INDICATION(S)

- Angine bactérienne en alternative aux pénicillines (EXTENCILLINE®, OSPEN®, CLAMOXYL®...).
- Pneumonie à germes atypiques.
- Infection cutanée généralisée (impétigo, érysipèle...).

- Infection génitale à Chlamydiae trachomatis.
- Infection de la bouche.

POSOLOGIE

1 dose-graduation par kilo le matin et le soir 1/2 heure avant les repas pendant **7 à 14 jours**.

Par exemple, pour un enfant de 4 kg, la dose à administrer par prise correspond à la seringue pour administration orale remplie jusqu' à la graduation 4.

- Nourrisson jusqu'à 5 kg (forme à 125 mg/5 ml).

- Enfant de 5 à 20 kg (forme à 250 mg/5 ml).
- Enfant de 10 à 40 kg (forme à 500 mg/5 ml).

Cas particuliers :

La durée du traitement des **angines** est de **5 jours**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Remplir le flacon avec de l'eau bouillie refroidie ou de l'eau en bouteille jusqu'au trait gravé dans le verre, conserver au frais. Bien agiter avant chaque prise.
En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à la josamycine.
- Intolérance au gluten.
- **Pimozide, Cisapride.**
- **Alcaloïdes de l'ergot de seigle.**

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT



Possible

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne pas donner en même temps que :

- Les Alcaloïdes de l'ergot de seigle (DHE®, METHERGIN®...) : risque de nécrose des extrémités.
- Le Cisapride (PREPULSID®) : risque de torsade de pointe (risque d'arrêt cardiaque).


- Le Pimozide (ORAP®) : risque de torsade de pointe (risque d'arrêt cardiaque).

EFFETS INDÉSIRABLES

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.


CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

FLACON OUVERT



Pas plus de 7 jours
au réfrigérateur

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



BACTRIM®
Suspension buvable 100 ml
+ cuillère mesure

COTRIMOXAZOLE

AVIS MEDICAL

■ INDICATION(S)

- Infections urinaires et génitales.
- Infections ORL (otite, sinusite).

■ POSOLOGIE

A prendre au milieu des repas.
30 mg/kg/jour de sulfaméthoxazole et 6 mg/kg/jour
de triméthoprime en 2 prises par jour pendant
8 à 10 jours.

- De 4 à 8 Kg : une demi cuillère mesure le matin et le soir¹.
- De 8 à 15 Kg : une cuillère mesure le matin et le soir.
- De 15 à 35 Kg : 2 cuillères mesures le matin et le soir.

Cas particuliers :

la durée du traitement d'une infection urinaire aigüe chez la petite fille à partir de 3ans est de 3 à 5 jours.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Enfant de moins de 1 mois (moins de 4 Kg).
- Allergie aux sulfamides.
- Déficit en G6PD.
- Atteinte du foie.
- **Méthotrexate.**

GROSSESSE



Impossible

ALLAITEMENT



Impossible

■ INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Méthotrexate : augmente la toxicité hématologique du méthotrexate.

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées
- Troubles hématologiques : arrêter le traitement et consulter le médecin.


■ EFFETS INDÉSIRABLES

- Hyperthermie, oedèmes de Quincke : arrêter le traitement et consulter le médecin.
- Eruptions cutanées : arrêter le traitement et consulter le médecin.

Les manifestations allergiques imposent un arrêt immédiat et définitif du traitement.


CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

FLACON OUVERT



Pas plus de 10 jours
au réfrigérateur

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



BACTRIM FORTE®
Comprimé oblong

COTRIMOXAZOLE

AVIS MEDICAL

■ INDICATION(S)

- Infections urinaires et génitales.
- Infections ORL (otite, sinusite).

■ POSOLOGIE

A prendre au milieu des repas.

Adulte de plus de 35 Kg :

La posologie habituelle est de 1 comprimé toutes les 12 heures pendant **8 à 10 jours**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Prématuré.
- Allergie aux sulfamides.
- Déficit en G6PD.
- Atteinte du foie.
- Méthotrexate.

GROSSESSE



Impossible

ALLAITEMENT



Impossible

■ INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


- Méthotrexate : augmente la toxicité hématologique du méthotrexate.
- Anticoagulants.
- Sulfamides hypoglycémiant : Diamicon®, Amarel®....

■ EFFETS INDÉSIRABLES

- Hyperthermie, oedèmes de Quincke : arrêter le traitement et consulter le médecin.
- Eruptions cutanées : arrêter le traitement et consulter le médecin.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Troubles hématologiques : arrêter le traitement et consulter le médecin.

Les manifestations allergiques imposent un arrêt immédiat et définitif du traitement.

CONSERVATION
TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



FURADANTINE 50®
Gélule

FURADOÏNE 50®
Comprimé



INDICATION(S)

Infections urinaires non compliquées chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

POSOLOGIE

Adulte :

- Traitement curatif :
1 ou 2 gélules le matin, le midi et le soir
de préférence **au cours des repas pendant 7 jours.**

Enfant de plus de 6 ans :

- Demander l'avis du médecin.

Le comprimé du soir doit se prendre au coucher après avoir vidé la vessie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.
Allaitement impossible si l'enfant a moins d'un mois

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie au nitrofurantoïne.
- Enfant de moins de 6 ans.
- Déficit en G6PD.
- Intolérance au gluten.

GROSSESSE



A éviter

ALLAITEMENT



A éviter
allaitement impossible
si l'enfant a moins d'un mois

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Pansements gastriques (MAALOX®...) :
séparer les prises d'un intervalle de 2 heures.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Troubles digestifs fréquents atténués par la prise de nourriture en même temps.
- Pneumopathie subaiguë après traitements prolongés, pouvant évoluer vers la fibrose en cas de poursuite du traitement.
- Les manifestations allergiques imposent un arrêt immédiat et définitif du traitement.

CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



FLAGYL®

Flacon de suspension buvable 120 ml + cuillère mesure



■ INDICATION(S)

- Amibiase : diarrhée sanglante.
- Lambliae.
- Certaines infections à germes anaérobies.

■ POSOLOGIE

Pour la lambliae la durée du traitement est de 5 jours :

- Enfant de 2 à 5 ans :
1 cuillère mesure matin et soir.
- Enfant de 5 à 10 ans :
1 cuillère mesure matin , midi et soir.
- Enfant de 10 à 15 ans :
2 cuillères mesure matin et soir.

Pour l'amibiase la durée du traitement est de 7 jours :

- Enfant de 8 à 12 Kg :
1 cuillère mesure matin , midi et soir.
- Enfant de 13 à 18Kg :
2 cuillères mesure matin et soir.
- Enfant de 19 à 25 Kg :
2 cuillères mesure matin, midi et soir.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux imidazolés.
- Intolérance au gluten, fructose.
- Insuffisance hépatique.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT



A éviter

■ INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Boissons alcoolisées.

■ EFFETS INDÉSIRABLES

- Neurologiques (confusion mentale) : arrêter le traitement et consulter le médecin.
- Eruptions cutanées.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, crampes épigastriques.


CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

FLACON OUVERT



Pas plus de 10 jours
au réfrigérateur

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



FLAGYL®
Comprimé pelliculé

AVIS MEDICAL

■ INDICATION(S)

- Amibiase : diarrhée sanglante.
- Lamblia, Trichomonas.
- Certaines infections à germes anaérobies.

■ POSOLOGIE

Amibiase

- Adulte : 1 comprimé à 500 mg **matin, midi et soir** pendant **7 jours**.
- Enfant de 13 à 18 Kg : 1 comprimé à 250 mg matin et soir pendant 7 jours.
- Enfant de 19 à 25 Kg : 1 comprimé à 250 mg matin, midi et soir pendant 7 jours.
- Enfant de 26 à 35 Kg : 2 comprimés à 250 mg matin et soir pendant 7 jours

Lamblia

- Adulte : un comprimé à 250 mg matin, midi et soir pendant **5 jours**.
- Enfant de 10 à 15 ans : 1 comprimé à 250 mg matin et soir pendant 5 jours.

Trichomonase

- Femme : 4 comprimés à 500 mg en une seule prise. Il faut traiter le partenaire en même temps.
- Homme : 1 comprimé à 250 mg matin et soir pendant **10 jours**.

Infections à germes anaérobies

Adulte : 1 comprimé à 500 mg matin et soir pendant **7 jours**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux imidazolés.
- Intolérance au gluten, fructose.
- Enfant de moins de 6 ans.

GROSSESSE



Possible

ALLAITEMENT



A éviter

■ INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Boissons alcoolisées.

■ EFFETS INDÉSIRABLES

- Neurologiques (confusion mentale) : arrêter le traitement et consulter le médecin.
- Eruptions cutanées.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, crampes épigastriques.

CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



DEC®
Comprimé sécable

NOTEZINE®
BANOCIDE®

INDICATION(S)

Filariose lymphatique de Bancroft.

PROTOCOLE

POSOLOGIE

En prophylaxie : 6 mg/kg en une prise 1 fois par an.

- Enfant de 2 à 5 ans : 1 comprimé à 100 mg.
- Enfant de 6 à 11 ans : 2 comprimés à 100 mg.
- Enfant de 12 à 16 ans : 3 comprimés à 100 mg.
- Adulte de Moins de 80 Kg : 4 comprimés à 100 mg.
- Plus de 80 Kg : 6 comprimés à 100 mg.

*En traitement : 6 mg/kg en une prise tous les 4 mois.
(protocole 18/8/04 Dr P.Biarez, G.Soubirand et coll.).*

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En l'absence d'amélioration au bout de 3 jours consulter le médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie au diéthylcarbamazine.

GROSSESSE



Impossible

ALLAITEMENT



Possible

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Boissons alcoolisées.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Fièvre : due à la destruction des microfilaries.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, crampes épigastriques.

CONSERVATION

TEMPÉRATURE



Inférieur à
30° C

ALBENDAZOLE
400 mg

INFECTIOLOGIE ANTIPARASITAIRES

SPÉCIALITÉ(S) COMMERCIALE(S)



ALBENDAZOLE®
Comprimé sécable

ZENTEL®

PROTOCOLE

■ INDICATION(S)

Filariose lymphatique de Bancroft.

■ POSOLOGIE

Même posologie pour l'enfant et l'adulte.

Filariose

Prendre 1 comprimé de 400 mg le matin en association avec la diéthylcarbamazine 6 mg/kg/j.

En prévention : 1 fois par an.

En traitement : tous les 4 mois pendant 1 an.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

GROSSESSE



Impossible

ALLAITEMENT




Possible

■ EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs abdominales, nausées, diarrhée.

CONSERVATION TEMPÉRATURE



Inférieur à
25° C